



## Лекарствена нефропатия

### Определение

Много лекарствени вещества оказват вредно въздействие върху бъбреците. Повечето лекарства се елиминират от организма с урината. Вредни за бъбреците са някои антибиотици като гентамицин, амикацин, канамицин, стрептомицин, сулфонамиди, рентгеноконтрастни вещества, бетаблокери, наркотни препарати, диуретици, калциеви препарати, витамин А, витамин Д, витамин С в по-голями количества, живачни препарати и други лекарствени средства.

### Клинична картина

При злоупотреба с болкоуспокоителни (аспирин, фенацетин и други) в продължение на много години се развива т. нар. аналгезийна нефропатия. Заболяването започва постепенно. Първите симптоми са поява на белтък в урината, тъпа поясна болка и трудно лечима анемия. В някои случаи настъпва некроза на бъбречните папили. В напреднал стадий се развива нефросклероза с прогресираща бъбречна недостатъчност. Обикновено артериалното налягане е нормално.

**Лечението** се състои в прекратяване на приема на болкоуспокояващите средства, освен по лекарско назначение.

**Прогнозата** на лекарствените нефропатии е добра при своевременно отстраняване на увреждащите бъбреците лекарствени вещества.

**Профилактиката** включва избягване на самолечение и приемане на медикаменти само по лекарско назначение.